БУЗ УР "РДКБ МЗ УР"
Удмуртская республика

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СЯРГУДУДСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, с. ДИГАЛЕВО
ул. СОВЕТСКАЯ, 110, тел. 2-46-79

ВЫПИСКА из ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 174481

Больной Глухов Артем Александрович
Находился на стационарном лечении в отделении: Патологии новорожденных и недоношенных детей с 11.09.17 по 17.10.17

ДИАГНОЗ основной:Последствия тяжелого гипоксически-ишемически- геморрагического поражения ЦНС. Внутренняя умеренная гидроцефалия.в стадии субкомпенсации. ПВЛ. Синдром гипервозбудимости. Двусторонний пирамидный синдром.
БЛД, новая форма, средней степени, вне обострения. ДН1-0. ООО. НК0.
ВПР почек. Гидронефроз справа, уретерогидронефроз слева . Гипоплазия левой почки. Вт. пиелонефрит, неполная ремиссия. Острая почечная недостаточность в анамнезе.
Недоношенность 30 недель. ПКВ 50-51 неделя. Скоррегированный 2.5 мес. Рахит 1, подострое течение. Дисплазия т/б суставов. Гипотрофия 1 степени. ОРВИ. реконвалисцент.

Антропометрические данные:
При поступлении: Вес - 4224 ; Рост - 58; Окр.головы - 37 ; Окр.груди - 39;
При выписке: Вес - 4966 ; Рост - 61 ; Окр.головы - 38.5 ; Окр.груди - 40 ;

ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ в СТАЦИОНАРЕ ПРОВЕДЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: в/м- амикацин 7 дней, цефтриаксон 5 дней, мексидол 10 дней, внутрь- витамин В6, аквадетрим, фенибут, верошпирон, бифидобактерин, фурагин, общий массаж, парафиновые аппликации.
На фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика- улучшился мышечный тонус, микроциркуляция, активнее реагирует на осмотр, появились элементы гуления, стал активнее сосать, в весе наметилась положительная динамика + 700гр. В крови и моче без воспалительных изменений, в посеве от 04.10 высев сапрофитного стафилококка в н/к.
Ребенок консультирован неврологом, пульмонологом, кардиологом, ЛОР абсолютных противопоказаний для оперативного лечения нет.

ИСХОД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: Выписывается в удовлетворительном состоянии.

Копии консультация специалистов, НСГ, УЗИ в.о., Рентгенологических исследований, ЭКГ, ЭХО-КГ прилагаются.

В контакте с инфекционными больными не был!
БЦЖ медотвод

РЕКОМЕНДАЦИИ: Наблюдение уч.педиатра, невролога, пульмонолога, кардиолога, ортопеда, уролога
Смесь НАН 1 по 120 мл, каши безглютеновые до 2 раз в день
Невролог , пульмонолог, ортопед через 1-1.5 месяца в поликлинике РДКБ
Кардиолог через 3 месяца в РКДЦ с ЭКГ
Профилактика вирусных заболеваний!!
От профилактических прививок м/отвод!
Продолжить: аквадетрим по 2 кап постоянно
фенибут т 0.25 по 1/6 в 14.00, 20.00 1.5 мес с постепенным снижением

Подари ЗАВТРА! тяжелобольным детям Удмуртии