

Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики
«Детская городская клиническая
поликлиника № 2 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
Травматолого-ортопедическое
амбулаторно-поликлиническое
отделение
426034 г. Ижевск, ул. Наговицына, 10; Тел. (3412) 43-02-88

Бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская клиническая поликлиника №2
министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
Травматолого – ортопедическое амбулаторно –
поликлиническое отделение
Адрес: 426034, Удмуртская республика, г.Ижевск,
ул. Наговицына 10, тел. (3412) 43-15-75

Осмотр ортопеда

Фадеев Валентин Игоревич, _____ года рождения, проживающий по адресу г. _____, состоит на учете у невролога по диагнозу «Спастический тетрапарез».

Жалобы на отставание в психомоторном развитии.

Объективно: Ребенок пропорционального телосложения. Ходит и стоит самостоятельно, но не продолжительное время, самостоятельно сидит. Себя обслуживает. При ходьбе опора на передний отдел стоп. Голову удерживает в нормальном положении. Голова обычной формы. Движения в шейном отделе позвоночника не ограничены.

Усилен кифоз в грудном отделе позвоночника. Линия, проведенная через остистые отростки грудных и поясничных позвонков, прямая. Пальпация позвоночника без болезненна. Грудная клетка обычной формы.

Верхние конечности одинаковой длины, оси прямые, объемы пассивных движений в суставах верхних конечностей не ограничены, объемы активных движений в суставах не ограничены, тугоподвижны.

Нижние конечности согнуты в коленных суставах до 165°, нижние конечности одинаковой длины. Объемы активных движений определяются с трудом, тугоподвижны. Объемы пассивных движений в тазобедренных суставах отведения/приведения до 200°/150°; внутренняя/внешняя ротация до 70°/120°, тугоподвижны. Пассивные движения в голеностопных суставах: в правом суставе сгибания/разгибания 110°/25°; в левом сгибания/разгибания 100°/35°, тугоподвижны. Своды стоп уплощены.

Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез. Спастическая комбинированная контрактура голеностопных суставов, справа ФНС 3 ст., слева ФНС 2 ст. Спастическая сгибательная контрактура коленных суставов, ФНС 1 ст. Спастическая приводящая контрактура тазобедренных суставов, ФНС 1 ст. Эквино-варусная деформация стоп, ФНС 0 ст.

Рекомендовано:

1. Оперативное лечение НИДОИ им Г.И.Турнера
2. Наблюдение невролога.
3. ЛФК в зале ежедневно.
4. ЛФК в бассейне.
5. Парафиновые «сапожки» №10-15, курсами.
6. Массаж общий с акцентом на нижние конечности №10-15, курсами.
7. Мануальная терапия 3-4 раза в год.
8. Тьюторы от в/3 бедра до кончиков пальцев в положении и при перекосе линии.
9. Сложная ортопедическая обувь при неврологической патологии.
10. Трость 3-х опорная регулируемая по высоте, с анатомической ручкой, с устройством противоскольжения.
11. Контрольные осмотры ортопеда 2 раза в год.



21.08.2017 г.