Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии

«РЕАЦЕНТР ИЖЕВСК»

Детское отделение неврологии рефлексотерапии

г. Ижевск, ул. Пушкинская 222 тел. (3412) 912-110.

ВЫПИСКА

Пациент (ФИО) Ибаев Джабраил Асламбекович.
Дата рождения 09.11.2010г.
Находился на амбулаторном лечении с 08.09.2014 по 24.09.2014 (1 курс)
с 10.11.2014 по 26.11.2014 (2 курс)

С диагнозом: Резидуально-органическое поражение ЦНС, смешанного генеза, гипертензионный синдром в стадии субкомпенсации, выраженный астено-гипердинамический синдром. ЗПРР. Сенсо-моторная алалия.

При поступлении: Ребенок гиперподвижен, возбудим, постоянно перемещается по комнате. На осмотр реагирует негативно вырывается, убегает. Периодически возникают всплески немотивированной агрессии по отношению к родственникам. Голова гидроцефальной формы, венозный рисунок усилен в височной области. При обращении к нему - контакт глазами мимолетный. Вступает в телесный контакт только с родственниками: прижимается, трогает. С медицинским персоналом в контакт не вступает, не обращает внимания на вопросы, просьбы не выполняет. Речевая активность низкая, в основном в виде элементов лепетной речи, редко произносит отдельные слова. Словарный запас ограничен небольшим количеством бытовых слов, которые произносятся неосознанно. С просьбами не обращается. На вопросы не отвечает. Все необходимое показывает жестами. Отмечается большое количество стереотипных движений, возникающих при эмоциональном возбуждении. Мелкая моторика кистей рук с элементами вычурных движений, не развита, не рисует, не умеет застегивать пуговицы и молнии. Игры носят разрушительный, примитивный, стереотипный характер, в виде постукивания по столу, перемещения игрушки в пространстве. Ролевой компонент в играх не выражен. Социальные навыки развиты не достаточно, ест самостоятельно ложкой, не раздевается, одеваться не умеет. Туалетные навыки не выработаны.

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии

При электропунктурном обследовании выявлены следующие функциональные изменения:

1. Нарушение ликвородинамики с сочетанным снижением адсорбции ликвора и его гиперпродукцией.
2. Выраженная симпатикотония с возбужденим центральной нервной системы.
3. Остаточные явления перинаталной гипоксии коры.
4. Дисфункция стволовых структур.
5. Снижение функциональной активности лобных долей.
6. Снижение функциональной активности речевых центров коры головного мозга: зоны Брокка, Вернике, Ассоциативных зон.
7. Дистония сосудов мозга.

Направленность программы лечения:

1. Стабилизация ликвородинамики, снижение внутричерепного давления.
2. Седативное воздействие на ЦНС.
3. Рефлекторная стимуляция функциональной активности лобных долей, корковых зон речи: зоны Брокка, Вернике и зоны Ассоциативной речи.
4. Умеренное седативное воздействие на зону Эго.
5. Стабилизация стволовых структур.
6. Стабилизация тонуса сосудов мозга.

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии