

НЕВРОЛОГ

Невролог 29.05.2018г.

Самодуров Игорь Владимирович

Жалобы на задержку в развитии ребенка. Голову не держит, не сидит, не ходит, не говорит, в игрушки не играет, периодически беспокойный, метеочувствителен, гиперкинезы головы и в конечностях. На инвалидности по неврологическому заболеванию с 2016 года.

Из анамнеза: недоношенность в 31 неделю беременности. Апгар 6-6 баллов

Регулярно получает курсы реабилитации и лечения: ИРТ, ЛФК, массаж, пальчиковая гимнастика, медикаментозное лечение ежеквартально. Занятия с логопедом. Остеопатия курсами.

Эффект незначительный (улучшился сон, более активно реагирует на окружающее).

Обследован - на МРТ головного мозга от 24.09.2014г. - умеренная наружная гидроцефалия.

ЭЭГ от 22.10.2015г. - типичной эпилептической активности не выявлено.

Нейроофтальмолог 27.05.2016г. - ангиопатия с венозным полнокровием, оптическая нейропатия.

Неврологический статус: Общее состояние удовлетворительное. Во время осмотра беспокойство. ОГ 46 см. округлой формы. Менингеальные знаки отрицательные. ЧМН - лицо симметричное, следит за игрушкой. Глазные щели равные, движение глазных яблок в полном объеме. Зрачки средних размеров, равные, фотореакция сохранена. Нистагма нет. Носогубные складки симметричны. Язык по средней линии с гиперкинезами. Небные и глоточные рефлексы вызываются, глотание не нарушено. Активные и пассивные движения в конечностях ограничены. Тонус мышц в конечностях повышен по спастическому типу с элементами дистоничности. Сухожильные и периостальные рефлексы в области верхних и нижних конечностей высокие D=S с расширенных рефлексогенных зон. Мышечная сила снижена 2 балла в верхних и нижних конечностях. Патологический симптом Бабинского положительный с двух сторон. Брюшные рефлексы вызываются симметрично. Не удерживает вертикальную позу, не опирается на стопы. Не сидит. Имеются крупно-размашистые гиперкинезы в руках, усиливаются при эмоциональном возбуждении. Не контролирует функцию тазовых органов, постоянно в памперсах. Не говорит (лепетная речь).

Диагноз: Детский церебральный паралич. Выраженная двойная гемиплегия. Смешанная гидроцефалия в стадии субкомпенсации. Умеренно выраженный подкорковый синдром (крупно-размашистые гиперкинезы в руках умеренно выражены). Выраженное нарушение функции тазовых органов вследствие отсутствия контроля. Сенсомоторная алалия выражена.

Рекомендации:

1. Курсы реабилитации и медикаментозное лечение ежеквартально
2. Реабилитация в РЦРДИ 2-3 курса в год
3. Сложно-ортопедическая обувь
4. Памперсы и адсорбирующее белье по 3 ед. в сутки.
5. Вертикализатор
6. Прогулочная коляска с фиксатором спины.
7. Войто-терапия, пальчиковая гимнастика.
8. Направляется на МСЭ.

Вр. Кодолова

