

Схема ХТ – ЕР (дозы и режим введения).

Цисплатин 20 мг/м² 1-5 дни в течение 1-часовой инфузии с маннитолом 20% в течение 1 часа 40мл/м² за 3 часа до введения цисплатина, на фоне введения цисплатина и 3 и 6 часов после введения цисплатина

детям-инвалидам Удмуртии

Этопозид 100 мг/м² разведенный в 0,4мг/мл в 0,9% физиологическом растворе 1, 2 и 3 дни в течение 1-часовой инфузии, вводить за 1 час до введения цисплатина

Прегидратация – 83мл/м²/час декстроза+физиологический раствор (эквивалентно 2 л/м²/сут), начать после 1-й инфузии маннитола до введения этопозид. Прегидратация останавливается сразу после начала введения этопозид.

Гидратация начинается сразу после завершения введения этопозид и продолжается 23 часа на фоне введения маннитола и цисплатина из расчета 83мл/м²/час. Инфузия 2 л/м² декстроза 2,5%+физиологический раствор 1:1.

Инфузия включает 2,5% декстрозу и 0,45% раствор NaCl в сочетании с калием, магнием и глюконатом кальция в дозах:

10 mmol KCl в 500 мл

5 mmol MgSO₄ в 500 мл

0,3 mmol глюконата кальция в 500 мл

Применение препаратов, имеющих нефротоксический побочный эффект, включая аминогликозиды или фуросемид в комбинации с цисплатином не показано.

детям-инвалидам Удмуртии

Модификация дозы ХП:

Лейкоциты менее 0,75 в 1 день цикла ПХТ – отсрочка на 3-4 дня, повторить ОАК. При восстановлении лейкоцитов $\geq 2,0$ тыс/мкл начинать цикл ХТ. Нежелательно вводить КСФ

Тромбоциты менее 75 тыс – редукция дозы цисплатина на 25%.

При лихорадке – отложить на 3-4 дня. При сохранении лихорадки более 7 дней и нетпении менее 500клеток – КСФ и редукция дозы цисплатина в следующем цикле на 25%.

При снижении слуха – замена цисплатина на карбоплатин.

При нефротоксичности – повышение креатинина в 1,5 раз от нормы – отсрочка введения ХП на 1 неделю. При отсутствии восстановления креатинина сыворотки – замена цисплатина на карбоплатин. Цисплатин вводить при восстановлении уровня креатинина и клиренса по эндогенному креатинину более 70.

При нейропатии – снижение дозы цисплатина на 25%. При 2 степени и более – цисплатин отменить.