

Выписка из амбулаторной карты

Кузнецов Данил Витальевич, д.р. [REDACTED]

Ребенок от 3 беременности. СПД - ОАА - 1 замершая бер., 1 кес. сечение - ребенок умер в 2 недельном возрасте. ГБ 2 ст. 3 стадия, риск 2. . С 22 недель - НМПК1СТ. в 19 НЕДЕЛЬ ПО УЗИ НИЗКАЯ ПЛАЦЕНТАЦИЯ. Ранний гестоз. В 16 недель ОРИ с Т 37.5. В 22 недели - УПБ. В 29 недель преэклампсия тяжелой ст. Роды 2 кес. сечение.

При рождении вес 1040 рост 34 Оценка по Апгар 6-8 баллов, перевод в 4 ГБ. ИВЛ ПЕРиодически, в общей сложности 2 недели.

Диагноз при выписке - Недоношенность 29 недель, ОНМТ, МГВ, ЗВУР. Синдром дезадаптации ссс, ООС, ОАП, НК2А. Ретинопатия 1ст, 1 зона, кровоизлияние в сетчатку обоих глаз. О. анемия новорожденного, ранняя анемия недоношенного. Вр. 2ст. пневмония, ДН 2 ст. Правосторонняя паховоомошоночная грыжа.

Сидит с 18 мес, ходит с 2года 1 мес.

Перенесенные заболевания: грыжесечение в 7 мес. Ветряная оспа. Скарлатина. Пневмония в 2014 и 2015

Наблюдается с диагнозом: детский церебральный паралич в форме спастической диплегии умеренно выраженной, грубее слева; умеренный церебрастенический синдром, синдром глазодвигательных нарушений, дизартрии. ЗПР, ЗРР. GMFCS II

Нейрогенные сгибательные контрактуры голеностопных суставов, ФНС 2 степени.

Нейрогенная тугоподвижность коленных и т/б суставов. ФНС 1 степени. Нарушение осанки по сколиотическому типу. Эквино-плано-вальгусная установка стоп. Соха valga обеих сторон. Гипертрофия небных и глоточной миндалин 2-3 степени. Бронхиальная астма легкое персистирующее течение. Гиперметропия средней степени обоих глаз. Сложный дальнозоркий астигматизм обоих глаз. Сходящееся содружественное альтернирующее косоглазие. Рефракционная амблиопия слабой степени обоих глаз.

Инвалидность впервые оформлена в 1 год 4 месяца в сентябре 2013 года, продлена до 18 лет.

06.11.19.

Участковый педиатр Пермякова А.В.

