

определяются, очаговой патологии нет. Периферия глазного дна по альбинотическому типу. Заключение: нельзя исключить частичную атрофию зрительных нервов ОУ.

2. **Диетолог (21.05.2014):** ребенку с выраженной недостаточностью питания для улучшения нутритивного статуса к диете П через зонд выписать дополнительное питание - Нутрини с пищевыми волокнами 200мл ежедневно, каша Фруто-няня молочная овсяная 1 пачка на 10 дней, каша Фруто-няня молочная мультизлаковая по 100мл x 5 раз в сутки.
3. **ЛОС (28.05.2014)** - Ледовый дротион для прорезывания зубов. Рекомендовано: вибуркол суппозитория 3 раза в день - 3-4 дня.

### Проведенное лечение:

1. **Комбилипен** 1,0 мл в/м 1 раз в 3 дня с 16.05. по 28.05.2014
2. **Глиатилин** 1,0 мл в/м с 16.05. по по 26.05.2014
3. **Конвулекс** по 7 капель x 3 раза в сутки (утро-обед-вечер) с 15.05. по 21.05.2014г, затем по 8 капель x 3 раза в сутки с 22.05. по 27.05.2014, затем по 9 капель x 3 раза в сутки с 28.05. по 30.05.2014г.
4. **Клоназепам (2мг)** 1/2 таб утро - 1/; таб вечер с 16.05. по 30.05.2014г.
5. **Тантум-верде** по 1д 3 раза в сутки с 23.05. по 30.05.2014г.
6. **Фолиева к-та (1мг)** 1/4т x 2 аза в день (утро, вечер) с 28.05. по 30.05.2014.

### Рекомендовано:

Вес - 8,5 кг.

1. **Наблюдение невролога, педиатра, кардиолога, гастроэнтеролога, офтальмолога по месту жительства.**
2. **Назначения специалистов** (см.консультации специалистов)
3. **МСЭК по месту жительства для решения вопроса о продлении инвалидности.**
4. **Кормление через назогастральный зонд.**
5. **Контроль общего анализа крови + гем синдром повторить через 1 неделю, далее не реже чем 1 раз в месяц (контроль уровня тромбоцитов).**
6. **Контроль биохимического анализа крови (АЛТ, АСТ, ЩФ, мочевины, креатинина, глюкоза) 1 раз в 3 месяца.** детям-инвалидам Удмуртии
7. **Контроль концентрации вальпроевой кислоты до и через 2 часа после приема препарата по месту жительства. Коррекция дозы по результатам анализа.**
8. **УЗИ органов брюшной полости и почек 1 раз в 6 месяцев.**
9. **КЭЭГ мониторинг, по возможности, дневного сна 1 раз в 3 месяца.**
10. **Конвулекс 9 капель x 3 раза в сутки (утро, бед, вечер) - длительно, постоянно.** При учащении эпилептических приступов, возможно повышение дозы до 30-40 мг/кг/в сутки под наблюдением невролога по месту жительства и контроле за уровнем тромбоцитов.
11. **Клоназепам (2мг) 1/3 таб x 2 раза в день (утро, вечер) - длительно, постоянно.** При учащении приступов и невозможности повышения дозы антиэпилептического препарата из группы вальпроатов возможно повышение дозы клоназепам до 0,1-0,2 мг/кг/сутки под наблюдением невролога по месту жительства и отсутствии побочных эффектов (гиперсаливация, сонливость).
12. **Фолиева кислота (1мг) 1/4т x 2 аза в день (утро, вечер) - 2 месяца.** Коррекция дозы под наблюдением гематолога, педиатра по месту жительства и контролем уровня тромбоцитов.
13. **Мильгамма 1/4т x 2 раза в день (утро, вечер) - 1 месяц, далее через 2 месяца Магне В6 1/4т x 2 раза в день (утро, вечер) - 2 месяца.**
14. **Глицин (0,1) 1/4т x 2 раза в сутки (утро, обед, вечер) - 2 месяца, далее, через 2 месяца, Пантогам (0,25) 1/4т x 2 раза в сутки (утро, обед) 2 месяца.**
15. **Элькар 30% 1,0 мл x 3 раза в день (утро, обед, вечер) - 2 месяца (курсами x 3 раза в год)**
16. **Кудесан 10 кап x 2 раза в день (утро, вечер) - 2 месяца (курсами x 3 раза в год)**
17. **ЛФК (дыхательная гимнастика, гимнастика по Vojta) (курсами x 3-4 раза в год)**

Подари ЗАВТРА!

детям-инвалидам Удмуртии