

Меньшиков Лев Вадимович, 1 г. 1 месяц (18.07.13 г.р.), находился в 4 х/о ДГКБ №13 с 10.07.14 по 27.08.14

Диагноз: Диафрагмальная грыжа справа.

Из анамнеза: Обследован по месту жительства в связи с плохой прибавкой в весе, периодически возникающей одышкой. Диагностирована диафрагмальная грыжа справа. Госпитализируется в 4 х/о для обследования и лечения.

При осмотре: Состояние средней степени тяжести. Жалобы на периодические отказы от еды. Кожные покровы нормальной окраски. Дыхание через нос свободное, справа в задних отделах резко ослаблено, при аускультации везикулярное, выслушиваются проводные хрипы. Тоны сердца ясные ритмичные. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Стул диурез в норме. Вес – 7100 г.

В отделении обследована:

11.07.14 Рентгенография грудной полости: инфильтративных изменений не отмечается. Правое легкое неравномерно пневматизировано. В нижней половине правого легкого отмечается зона кровотока. Контур его четкий, неравномерный (диафрагмальная грыжа – потели тонкого кишечника?). Легочный рисунок справа обеднен. Левое легкое вздуто, легочный рисунок слева усилен. Левый купол диафрагмы четкий, ровный. Правый отчетливо не определяется, синусы слева свободны, справа затемнены. Тень средостения смещена влево.

17.07.14 Эхо-КГ: Заключение – признаков пороков развития и заболеваний сердца не выявлено (ребенок беспокоился при исследовании). Систолическая функция желудочков не нарушена. Показатели эхометрии сердца в пределах нормы.

17.07.14 УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: Печень не увеличена, ПЗР правой доли 72 мм, левой доли 45 мм. Край печени острый. Паренхима печени средней эхогенности, однородная. Видимые фрагменты внутрипеченочных желчных протоков не дилатированы, стенки их не изменены. Желчный пузырь правильной формы, стенки тонкие, полость эхонегативна. Поджелудочная железа: 5х5х9 мм, не увеличена. Контуры четкие, ровные. Паренхима средней эхогенности, однородная. Селезенка 53х26, не увеличена. Контуры ровные, четкие. Паренхима средней эхогенности, однородная. Почки – левая: расположена типично. Контуры его четкие, ровные. Размеры 68х31 мм. Паренхима 10 мм, КМД сохранна. ЧЛС не расширена. При ЦДК кровоток прослеживается до капсулы. Правая: расположена типично. Контуры его четкие, ровные. Размеры 68х24 мм. Паренхима 10 мм, КМД сохранна. ЧЛС не расширена. При ЦДК кровоток прослеживается до капсулы. Свободная жидкость не определяется.

17.07.14 НСГ – структуры головного мозга расположены правильно, дифференцированы, зрелость соответствует возрасту. Рисунок борозд, извилин четкий. Ликворная система: Боковые желудочки не расширены. Поперечный размер передних рогов – 30 мм. Косой размер переднего рога: справа 2,0 мм, слева 2,0 мм. III желудочек – 1,9 мм, не расширен. IV желудочек не расширен. Большая цистерна мозга не расширена. Субарахноидальное пространство по конвекситальным отделам полушарий не расширено. Межполушарная щель – 2,5 мм, не расширена (норма 3-4 мм). Структурные изменения – эхогенность перивентрикулярных зон средняя с обеих сторон. Зрительные бугры без особенностей. Каудоталамическая борозда справа/слева без особенностей. Сосудистые сплетения эхооднородные, симметричные. Патологических участков в визуализируемых отделах вещества мозга не выявлено. Заключение: головной мозг без структурной патологии.

17.07.14 УЗИ плевральных полостей: в плевральной полости справа 5 мл анэхогенной жидкости.

17.07.14 УЗИ брахиоцефальных сосудов: ВЯВ справа 7 мм, слева 8 мм. ПВ справа 3,5 мм, слева 3,2 мм.

24.07.14 операция: Торакоскопическая пластика правого купола диафрагмы.

Тяжесть послеоперационного периода соответствует объему оперативного вмешательства. На 2 п/о сутки отмечалось увеличение размеров живота. Пассаж по кишечнику восстановился на 2 п/о сутки. Экстубирован на 3 п/о сутки.

25.07.14 ЭКГ: снижен вольтаж в стандартных отведениях. Умеренная синусовая тахикардия, ЧСС 150-166 в минуту. Вертикальное положение ЭОС. Диффузные изменения в миокарде. Гипокалиемия?

25.07.14 УЗИ брюшной, плевральных полостей: в брюшной полости определяется свободная жидкость. В правом латеральном канале 14 мл. В левом латеральном канале 40 мл жидкости с небольшой взвесью. Петли кишечника не расширены. Перистальтика сохранена.

Плевральная полость – жидкость слева не определяется, справа до 15 мл.

26.07.14 УЗИ брюшной, плевральных полостей: в правой плевральной полости свободной жидкости нет. В левой плевральной полости 25,0 мл жидкости, определяется гиповентиляция сегментов нижней доли левого легкого. Свободный газ в брюшной полости не определяется. Газонаполнение кишечника неравномерно повышено, петли до 12 мм в диаметре, перистальтируют. Количество свободной жидкостиросло (около 400 мл). В латеральных каналах под левым куполом

