



ПАЛЛАДИУМ

Каменских София Александровна
нейрологик и диагностики

Дата осмотра 20.06.2022 г.

Осмотр ортопеда.



Жалобы на нарушение походки, быструю утомляемость, неправильную установку стоп, ограничение движений в суставах нижних конечностей.

Объективно: Голова обычной формы. Мышцы шеи мягкие, эластичные, патологических образований не обнаружено. Объем движений в шейном отделе позвоночника не ограничен. Грудная клетка обычной формы. Определяется асимметрия положения надплечий, треугольников талии, нижних углов лопаток. Тест Адамса положительный.

Движения в суставах верхних конечностей не ограничены, безболезненные. Укорочение левой верхней конечности на 1,0 см. умеренная гипотрофия левого предплечья на 1,0 см.

Определяется укорочение левой нижней конечности на 5-7 мм. Движения в тазобедренных суставах: сгибание до 50° , разгибание до 180° , внутренняя ротация до 30° , наружная ротация до 60° , отведение до 200° , приведение до 160° , разведение в тазобедренных суставах - 60° . Активные и пассивные движения в коленных суставах: сгибание до 40° , разгибание до 180° . Движения в голеностопных суставах: справа - тыльное пассивное сгибание до 70° , подошвенное пассивное сгибание до 155° ; слева - тыльное сгибание до $90-95^\circ$, подошвенное сгибание до 155° . При ходьбе правой стопой не полностью опирается (отрывает пятку). Продольные своды стоп уплощены, определяется вальгусное отклонение стоп в подтаранных суставах не более 15 градусов.

Диагноз: «ДЦП. Левосторонний гемипарез. Нейрогенная сгибательная контрактура левого голеностопного сустава, ФНС 2 степени. Плано-вальгусная установка стоп. Укорочение левой нижней конечности на 7 мм. Укорочение левой верхней конечности на 1,0 см. S-образный идиопатический ювенильный сколиоз, 2 степени. ФНС позвоночника 0 степени». GMFCS – 1 уровень. MACS – 1 уровень.

Рекомендовано:

1. Д-р учет ортопеда 2 раза в год.
 2. Ношение и изготовление сложной ортопедической обуви при неврологических заболеваниях со стельками – супинаторами и компенсацией длины левой нижней конечности на 5 мм.
 3. Изготовление и ношение тутора для иммобилизации левого голеностопного сустава до в/з голени на время сна.
 4. ЛФК суставов верхних и нижних конечностей.
 5. Механотерапия, ЛФК для формирования мышечного корсета спины. ШРОТ – терапия.

- Подари ЗДОРОВЬЕ*
ным детям Удмуртии
6. Общий массаж № 10 (4 курса в год).
 7. Парaffиновые аппликации на нижние конечности курсами в течение года (сапожки).
 8. Показаний для ношения корсета нет.
 9. Ботулинотерапия. После ботулинотерапии показано этапное гипсование при тыльной флексии до 80 градусов, если угол менее 80 градусов – гипсование не показано.
 10. Занятия на уроках физкультуры в специализированной группе (не противопоказаны занятия лыжами и плаванием).
 11. Занятия танцами не противопоказаны.
 12. Показаний для оперативного лечения на момент осмотра нет.

Травматолог - ортопед, к.м.н.

Каменских М.С.

