

«РЕАЦЕНТР ИЖЕВСК»

Детское отделение неврологии рефлексотерапии

г. Ижевск, ул. Красная 119, тел. (3412) 912-110.

Подари ЗАВТРА **ВЫПИСКА**

Пациентка: Свицова Виктория Андреевна

26.06.2007 г.р.

Находилась на амбулаторном лечении 1 курс с 18.10.2010 по 05.11.2010
2 курс с 06.12.2010 по 24.12.2010
3 курс с 21.02.2011 по 18.03.2011
4 курс с 11.07.2011 по 29.07.2011

С диагнозом: Резидуально-органическое поражение ЦНС, спастический правосторонний гемипарез с умеренно выраженным нарушением двигательных функций, гипертензионно-гидроцефальный синдром, легкий мозжечковый синдром. ЗРР, дизартрия.

При поступлении: Ребенок реагирует на осмотр адекватно, вступает в эмоциональный контакт улыбается. Голова гидроцефальной формы, венозный рисунок умеренно выражен в височной области. Глазные щели $S = D$, реакция на свет сохранена, взгляд фиксирует на предметах. Обильное слюнотечение. Ассиметрия плечевого пояса, крыловидные лопатки. В верхних конечностях отмечается повышение мышечного тонуса, с преобладанием в сгибателях в дистальных отделах, руки держит в кулачках, супинация нарушена, затруднено разгибание в локтевых суставах и отведение рук в стороны. Лежа на животе на руки не опирается, при попытке поставить на четвереньки опоры на верхние конечности нет.

Мышечный тонус в нижних конечностях повышен, с преобладанием в дистальных отделах, при пассивной вертикализации опора достаточная, на передний край стопы. При ходьбе с поддержкой за туловище приподнимается на передний край стопы, выражен перекрест. шаговые движения осуществляет на прямых ногах, затруднено сгибания в коленных суставах, ноги ведет через бок. Ребенок эмоционально реагирует на разговор с ним, родственников узнает, с интересом рассматривает яркие игрушки, картинки в детских книжках. Речевая активность низкая на уровне отдельных слогов, слов обозначения. Ест сама, пьет из чашки. Одевает самостоятельно колготки. Туалетные навыки не выработаны.

Анамнез: Беременность 2, протекала на фоне гипертонии, отеков. Роды 2 срочные, самопроизвольные, обвитие пуповиной, вес при рождении 3600 г, по шкале Апгар 9-10 баллов. Находилась в реанимации, в отделении патологии новорожденных 3 недели.

При электропунктурном обследовании выявлены следующие функциональные изменения:

1. Нарушение ликвородинамики с гиперпродукцией ликвора и снижением его адсорбции.
2. Дисфункция стволовых структур и шейных сегментов спинного мозга.
3. Мышечная дистония гипоксического генеза.
4. Снижение функциональной активности лобных долей и моторных зон коры.
5. Снижение функциональной активности речевых зон коры:
Зоны Брокка, зоны Вернике, зоны Ассоциативной речи.
6. Умеренная симпатикотония с возбуждением ЦНС.
7. Снижение функциональной активности лобных долей.
8. Дистония сосудов головного мозга.

Направленность программы лечения:

1. Стабилизация ликвородинамики.
2. Стабилизация функциональной активности стволовых структур.
3. Рефлекторное снижение мышечного тонуса нижних конечностей.

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии