

11.07.2017г. Васев Тимур Павлович, 07.04.2005г.

Ухудшение поведения в виде избыточной двигательной активности, нетерпеливости, с по дому, постоянно при этом повторяет «ну», «ну», потирает руки; активно интересуется ми; отмечаются выраженные трудности при обучении; часто останавливается, не завершая начатое действие; беспокоит недержание мочи во время ночного сна до 3-х р/ночь;

Тяжелобольным детям Удмуртии  
Вне отмечались приступы нарушения сознания в виде подергивания конечностей, в этот момент могут являться эпизоды мочеиспускания (бывают эпизоды ночного недержания мочи), приступ мог провоцироваться эмоциональной нагрузкой, беспокоили приступы судорог в виде общего тремора длительностью до 5 мин с 11.2016г. в теч. дня однократно, могли провоцироваться умственной нагрузкой; ранее отмечалось выраженное снижение волевой активности, часто сидел бездействуя; Наблюдается неврологом по поводу эпилепсии с 12.2015г.

В 2014 г. появились жалобы на слабость, головокружение, нарушение координации, утомляемость, снижение успеваемости в школе с нарастанием выраженности симптоматики. К неврологу обращались в 2015г. Исследован. На ЭЭГ 29.12.2015г. – эпилептиформная активность.

В декабре 2015г. по 07.2016г. получал депакин, отмечалось повышение веса, приступы в начале приема купировались, возобновились через 1 мес, отмечалась сонливость, повышение аппетита, эмоциональная лабильность. Летом 2016г. отмечалась выраженная сонливость, безынициативность, периодические эмоциональные вспышки. Обратились к психиатру, в 07-08.2016г. находился на стационарном лечении РКПБ. Повторная госпитализация в РКПБ в 11.2016-03, 2017г. В 10.2016г. оформлена инвалидность в РКПБ.

Отмечалась в 2016-2017г. отрицательная динамика в состоянии в виде полиморфности приступов, ухудшение психического статуса, снижения способности к обучению, необходимости постоянной помощи посторонних. Получал топамакс 100 мг\*2 р, конвулекс 300мг таб по 1,5\*2 р.

С 04. 2017 по 05.05.2017г. находился в детском психоневрологическом отделении Университетской детской психической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова г. Москва, выписан с диагнозом: Идиопатическая фокальная эпилепсия. Соп. Дз: Шизофренический психоз с синдромом психического автоматизма, кататоническим ступором и эмоционально-волевым снижением. ООО. ПМК 1 ст, НК о.

В 05.2017г. отменили конвулекс.

В настоящее время получает: топамакс 50 мг по 2 т утром, днем, галоперидол 1,5 мг утром, неулептил 5 кап. 2

Время нахождения ребенка в РКПБ отмечалось ухудшение состояния в виде заторможенности при замене топамакса на дженерики, при возобновлении приема топамакса – улучшение активности.

Отмечается положительная динамика в виде улучшения познавательной деятельности, нарастания активности психической, речевой.

N.st.: При осмотре активен. Речь со смазанным произношением. Инструкции выполняет при уточнении. Периодически улыбается. Темные круги вокруг глаз. Голова округлая. Глазные щели D=S, движения глазных яблок в полном объеме, зрачки равны, фотореакция живая, D=S. Слабость конвергенции с обеих сторон. Носогубные складки симметричные, язык по средней линии. Тонус мышц в конечностях удовлетворительный, рефлексы с рук и ног живые, равные. Мышечная сила в руках и ногах 5б. Патологических знаков нет. Чувствительность сохранена. Менингеальные знаки отрицательные. Функцию тазовых органов не контролирует во время сна.

Эпилептолог 18.07.2017г.: Эпилепсия идиопатическая фокальная частыми приступами. Шизофренический психоз с синдромом психического автоматизма, кататоническим ступором и эмоционально-волевым снижением. Рекомендован постоянный прием оригинального топирамата – топамакс.

ЭЭГ от 14.06.2017г.: Значительные общ. Иррит. Изменения с признаками Раздр. Кору, в виде БСВ острых тета волн с преобладанием влево.

Вывод: Идиопатическая фокальная эпилепсия с частыми приступами с выраженными нарушениями поведения, познавательной деятельности.

Рек.: Продолжить постоянный прием противосудорожной терапии (топамакс 100 мг\*2 р/день в связи с отрицательной динамикой в состоянии на приеме дженериков), наблюдение психиатра, невролога, педиатра.

Тяжелобольным детям Удмуртии