

малоболь: на нарушение крупной и мелкой моторики (с трудом прикладывает кошке, левит миску, неправильное держит ручку и ложку, крупный неровный почерк), на быструю утомляемость, трудно включается в учебную и бытовую деятельность, трудности в установлении контактов со сверстниками, эмоционально лабильность.

Анамнез: До 1,5 лет НОР - по возрасту, после ЗВТРА АКДС прививками -  $T^{\circ}$  до  $40^{\circ}\text{C}$  - отказ в развитии (пропал зрительный контакт, утрачены навыки самообслуживания).

Фразовая речь появилась к 4 годам.

Объективно: Вступает в контакт с врачами, заинтересован во взаимодействии, охотно рассказывает про свою игрушку. Игрушки выполняет. Исполняет Считалочку. Быстро зрительный контакт. Быстро интересуется. ЧМН - менее расхоющееся космическое. Язык утолщен. Трудности в



переломы артия. поз. гиперсоми-  
вазодилатация. Симптомы провала при  
наклонении и.о.п. Ассиметричные параличи,  
лопаток, мышц спины, остей таза.

Умеренная мышечная гипотония  
гидроцефалия. Гипермобильность суставов.  
В произвольных движениях - гиперметрия,  
интензия. Похоже с широкой базой.  
Сон хороший. Тазовых нарушений нет.  
Закон: Персистирующее тироидное заболевание в  
виде астено-гиперкинетического синдрома,  
умеренного мозжечкового синдрома,  
дисертрии. Ретроцеребеллярная киста.  
Функциональные нарушения.

Рекло:

- 1) Микроэмульсия ретинола 100000 ИУ по 7,0 мл  
2) Тиамин бр г/приме внутрь по 7,0 мл  
N 6. Внутрь по 3 мл x 2 р/день (утро, день)  
Курс 1 месяц. Повторить 2/3 2 месяца.  
3) Детраменс в соме 1000 мг N 30  
по 1/3 соме x 2 р/день Курс 1,5-2 мес 2-3 р/год.  
4) Развитие крупной и мелкой моторики.  
5) Лечебная гимнастика. Массаж общий укрепляющий,  
+ шейное.  
6) vit C 300 мг x 2 р/день курс по 1,5 мес  
2 курса в год. 9) Подготовительная  
7) Мейнотоксификация функции в  
8) Сенсорная интеграция