





Координация движений:

Проба Ромберга:

Типично для детей: замедление

Локомоторные пробы:

Адиадохокинез:

Гиперкинезы:

Походка:

Чувствительность:

Симптомы натяжения:

Осанка:

Мышечно-тонический рефлекторный синдром:

Миофасциальный синдром:

Вегетативно-трофическая сфера:

потоотделение -

температура -

трофика кожи -

дермографизм -

Тазовые функции:

Заключение:

Подари ЗНАЙКУ!  
Типично для детей: замедление

Результативно функциональное  
нарушение ЧНС при гипертонии  
и артериальной гипертензии синдром  
(астено-нейропат. вариант)  
чрезмерной статики.  
Задержка наружного газовыделения  
и раннего дет. артрита;  
Рецидивы;

Лечение:  
1. Наиболее эффективно;  
психотерапия;

2. Конс. аспирин (аналог);

3. Глиурепин 50% 1 раз в 2 дн (чтврт)

200 мг, 200 мг - 2-3 нед;

4. Мексидол 0,125: 1/4 л x 2 дн (чтврт)  
= > 1/2 лаб. x 2 дн - 1 мес;



Врач

Дерюшева Л. И.

С пациентом обсуждены аспекты лекарственной терапии данного заболевания, даны рекомендации по профилактике возможных осложнений.

ОСМОТР НЕВРОЛОГА

Ф.И.О.

Возраст

5. Мильчакова - композитор  
1/3 год. x 3р (4;81 - 3 кг),  
6. Контр. осмотр с рег.кем  
(комп. обучение/т.д.)  
при изменениях на фоне  
— мкт г/и, контроль  
в динамике.



Подари ЗАВТРА!  
Технологиями детям. Здоровье.