

Опора на носочки. Ходьба с перекрестом, грубо на носочках. Ходьба вялая с поддержкой.
Гиперкинезов не выявлено. Чувствительность оценить невозможно.

Вегетативная нервная система нарушена. Гипергидроз +.

Масса 12,2 кг. Речи нет. В поведении не адекватен.

детям-инвалидам Удмуртии

Диагноз: Врожденный порок развития головного мозга. Голопрозэнцефалия, лобарная форма. Агенезия мозолистого тела. Внутренняя асимметричная ($D > S$) гидроцефалия в стадии субкомпенсации. Частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз.

ДЦП смешанная форма, спастический тетрапарез тяжелой степени тяжести. Псевдобульбарный синдром легкой степени тяжести. Задержка психомоторного и речевого развития выраженная.

Эпилепсия симптоматическая, фокальные моторные тонические приступы, адверсивные приступы (вправо) с вторичной генерализацией в генерализованные тонико-клонические приступы при пробуждении, миоклонические приступы.

Нестойкая клиническая медикаментозная ремиссия 8мес.

Эквино-плано-вальгусная установка стоп. Нейрогенная тугоподвижность суставов конечностей, ФН 2 степени. Сутулая спина.

Рекомендовано: Режим! Дневник приступов! КЭЭГ сна.

Вальпроевая кислота (Конвулекс) 500мг, таблетки пролонгированного действия (500мг/сут., 40мг/кг/сут.) Постоянно!

утро – 1/2 таб. (250мг)

на ночь – 1/2 таб. (250мг)

Топирамат (Топамакс) 25мг капсулы (25мг/сут., 2,0мг/кг/сут.) Постоянно!

утро – 1/2 капсулы (12,5мг)

на ночь – 1/2 капсулы (12,5мг)

Актовегин таблетки 200мг 1/2 таб. x 2 раза в день 1мес.

Элькар капли 30 % 10 капель x 2 раза в день, растворив в 1 чайной ложке воды, 1мес.

Ацетазоламид (Диакарб) 250мг 1/2 таб. x утром, до еды, по схеме (+ + + - - - - + + + - - - - + + +)

Панангин 1/2 таб. x 2 раза в день 1мес. (с 1-го дня назначения Диакарба).

Витамин Е 10 % 3 капли x 2 раза в день 1мес. (капать в рот).

Полный анализ крови с формулой и с количеством тромбоцитов 1 раз в 4мес.

Биохимия крови из вены **натощак** (после сна, перед сдачей крови: не пить, не есть, зубы не чистить, жвачки не жевать) (АСТ, АЛТ, ЩФ, Сахар крови, Билирубин) 1 раз в 4мес.

Диета богатая кальцием и фосфором (твердый сыр, рыба).

УЗИ внутренних органов по месту жительства 1 раз в год.

Ограничение просмотра телевизора (1 час в сутки).

В бане не парить! Ванны под постоянным контролем родителей, $t = 36,0^{\circ} \text{C}$.

Наблюдение нейрохирурга.

Лечение ортопеда.

Наблюдение невролога по месту жительства.

Явка с КЭЭГ сна.

Врач невролог _____



Авдеев И.В.